

ГЕМАТОЛОГИЯ

Задание: выбери правильный ответ

1. Наиболее частая причина развития железодефицитной анемии:
 - А) дефицит витаминов
 - Б) хронические кровопотери
 - В) избыточное употребление углеводов
 - Г) избыточное употребление белков
2. Основные симптомы при железодефицитной анемии:
 - А) раздражительность, бессонница
 - Б) лихорадка, головная боль
 - В) обмороки, головная боль
 - Г) отёки, боли в пояснице
3. Заболевание, при котором наблюдаются слабость, головокружение, извращение вкуса и обоняния:
 - А) острый лейкоз
 - Б) хронический лейкоз
 - В) железодефицитная анемия
 - Г) В 12-дефицитная анемия
4. Железодефицитная анемия по цветовому показателю:
 - А) гипохромная
 - Б) гиперхромная
 - В) нормохромная
5. При железодефицитной анемии медсестра рекомендует пациенту в больших количествах употреблять:
 - А) кашу
 - Б) молоко
 - В) мясо
 - Г) овощи
6. Медсестра рекомендует пациенту запивать препараты железа:
 - А) кофе
 - Б) кислым фруктовым соком
 - В) минеральной водой
 - Г) чаем
7. Препарат железа для парентерального применения:
 - А) гемостимулин
 - Б) феррокаль
 - В) ферроплекс
 - Г) феррум-лек

8. При лечении железодефицитной анемии используется:
- А) аспаркам
 - Б) аскорутин
 - В) актиферрин
 - Г) цианокобаламин
9. Анемия Аддисона-Бирмера развивается при дефиците витамина:
- А) В 1
 - Б) В 2
 - В) В 6
 - Г) В 12
10. Основная причина В 12-дефицитной анемии:
- А) атрофический гастрит
 - Б) кровохарканье
 - В) обильные менструации
 - Г) геморрой
11. Симптомы В 12-дефицитной анемии.
- А) извращение вкуса и обоняния
 - Б) рвота «кофейной гущей», дёгтеобразный стул
 - В) отрыжка горьким, боль в правом подреберье
 - Г) жжение в языке, онемение конечностей
12. Кожные покровы при В 12- дефицитной анемии:
- А) бледные
 - Б) гиперемированные
 - В) бледно - желтушные
 - Г) цианотичные
13. Заболевание, при котором наблюдается красный «лакированный» язык:
- А) железодефицитная анемия
 - Б) В 12- дефицитная анемия
 - В) острый лейкоз
 - Г) хронический лейкоз
14. В 12-дефицитная анемия по цветовому показателю:
- А) гипохромная
 - Б) гиперхромная
 - В) нормохромная
15. При лечении В 12-дефицитной анемии используется
- А) адреналин
 - Б) гепарин
 - В) ферроплекс
 - Г) цианокобаламин